

Zgodnja sorta, relativno dobro odporna na krastavost in daje velike zgodnje pridelke.

- Relativno veliki izenačeni ovalno podolgovati gomolji s plitvimi očesci, svetlo rumeno kožico in svetlo rumenim mesom.
- Primerna za kuhanje, z dobrimi kuharskimi lastnostmi.
- Odporna na krastavost, na nematode PCN (RO1&4), krompirjev rak (1) in primerna za krajše skladiščenje.



Lastnosti

Uporaba

vsestranska uporaba
za svežo porabo

Značilnosti rastline


Zgodnost zgodnja
Začetni razvoj dober
Barva cveta bel

Značilnosti gomoljev

Barva kožice rumena
Barva mesa rumena
Oblika gomolja podolgovato ovalni
Število gomoljev malo
Velikost gomoljev srednja
Izenačenost gomoljev izenačeni
Globina očes plitva
Vsebnost suhe snov 18%
Podvodna teža 325
Kuharski tip AB
Poškodbe pri izkopu zelo občutljiva
Črnenje gomoljev malo občutljiva
Dormanca kratka

Odpornost

Nematode RO 1-4	odporna
Nematode RO 2-3	dovzeta
Nematode PA2	dovzeta
Nematode PA3	dovzeta
Yn-virus	precej občutljiva
Yntn-virus	precej občutljiva
Krastavost	precej odporna
Prašna krastavost	precej občutljiva
Plesen na gomoljih	precej občutljiva
Plesen na listih	občutljiva
Tobakov mozaik	precej občutljiva
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	dokaj občutljiva



Interseme

Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana / Slovenija
T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24
I www.interseme.si

Gojenje Priprava

Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek+10%

Prirpava semena

Kaliče lahko odstranimo največ enkrat. Ranomi lahko sadimo direktno iz hladilnice.

Razdalja

28/35: 25 cm (54,000 plants/ha).

35/55: 30 cm (45,000 plants/ha).



¹: Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Gojenje

Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči močno listno reakcijo in nekoliko zmanjša pridelek.

Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Ranomi občutljiv na krompirjevo plesen.



Spravilo & Skladiščenje

Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj dva tedna. Ranomi je zelo občutljiv na mehanske poškodbe in nekoliko na črnenje gomoljev.

Skladiščenje

Ranomi ima kratko dormanco in je primeren za kratkotrajno skladiščenje.

